**Liste von Biotoptypen zur Einstufung der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im Freistaat Sachsen im Rahmen der Richtlinie Natürliches Erbe (FRL NE/2023)**

| Code | Bezeichnung | Wertstufe (Fördersatz) | Stufe A-D (VAK) |
|---|---|---|---|
| **BA** | **Feldgehölz** | 2 | C |
| **BF** | **Feuchtgebüsch** | 2 | C |
| BFA | Weiden-Auengebüsch | 1 | B |
| BFS | Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch | 2 | C |
| **BH** | **Feldhecke** | 2 | C |
| **BM** | **Gebüsch frischer Standorte** | 2 | C |
| **BS** | **Streuobstwiese** | 1 | B |
| **BT** | **Trockengebüsch** | 2 | C |
| BYA | Allee und Baumreihe | 2 | C |
| BYE | Einzelbaum, Baumgruppe | 2 | C |
| BYK | Kopfbaum und Kopfbaumreihe | 1 | B |
| BYO | Obstbaumreihe und -allee | 2 | C |
| BYP | Park, sonstiger Gehölzbestand | 2 | C |
| **FB** | **Naturnaher Bach** | 1 | B |
| FBB | Naturnaher sommerkalter Bach (Berglandbach) | 2 | C |
| FBM | naturnaher Mittelgebirgsbach | 2 | C |
| FBN | Naturnaher sommerwarmer Bach (Tieflandbach) | 1 | B |
| **FF** | **Naturnaher Fluss** | 1 | B |
| FFB | Naturnaher sommerkalter Fluss | 1 | B |
| FFN | Naturnaher sommerwarmer Fluss | 1 | B |
| FFS | Zeitweilig trockenfall. Schlammfl. m. Pionierveg. | 1 | B |
| **FG** | **(Naturnaher) Graben/Kanal** | 2 | C |
| **FQ** | **Naturnaher Quellbereich** | 1 | B |
| FQA | Kalkarme Sickerquelle | 1 | B |
| FQK | Kalktuffquelle | 1 | A |
| FQN | Sickerquelle | 1 | B |
| FQR | Kalkreiche Sickerquelle | 1 | A |
| FQS | Sturzquelle | 1 | B |
| FQT | Tümpelquelle | 1 | A |
| **GB** | **Bergwiese** | 1 | B |
| **GF** | **Feucht- und Nassgrünland (extensiv)** | 1 | B |
| GFA | Wechselfeuchte Stromtalwiese | 1 | A |
| GFF | Seggen- u. binsenreiche Feuchtweiden u. Flutrasen | 2 | C |
| GFP | Pfeifengraswiese | 1 | A |
| GFS | Nasswiese | 1 | B |
| GFY | Sonstiges artenreiches Feuchtgrünland | 2 | C |
| **GM** | **Extens. genutzt. mageres Grünl. frisch. Standorte** | 1 | B |
| GMM | Magere Frischwiese | 1 | B |
| GMS | Submontane Goldhafer-Frischwiese | 1 | B |

| Code | Bezeichnung | Wertstufe (Fördersatz) | Stufe A-D (VAK) |
|---|---|---|---|
| GMW | Magerweide frischer Standorte | 1 | B |
| **GP** | **Pfeifengraswiese** | 1 | A |
| GPA | Pfeifengras-Wiese basenarmer Standorte | 1 | A |
| GPR | Pfeifengras-Wiese basenreicher Standorte | 1 | A |
| **GY** | **Sonst. extensiv genutztes Grünl. frisch. Standorte** | 2 | C |
| GYM | Sonstige extensiv genutzte Frischwiese | 2 | C |
| GYW | Sonstiges extensiv genutzte Weide frischer Standorte | 2 | C |
| GYY | Sonstiges extensiv genutztes frisches Grünland | 2 | C |
| **HG** | **Besenginsterheide** | 2 | C |
| **HW** | **Wacholderheiden und -gebüsche** | 1 | A |
| **HZ** | **Zwergstrauchheide** | 1 | B |
| HZB | Bergheide | 1 | B |
| HZF | Feuchtheide | 1 | A |
| HZG | Felsbandheide | 2 | C |
| HZS | Trockene Sandheide | 1 | B |
| **LF** | **Staudenflur feuchter Standorte** | 2 | C |
| LFB | Hochmontan-subalpine Hochstaudenflur | 1 | B |
| LFS | Hochstaudenflur sumpfiger Standorte | 2 | C |
| LFU | Uferstaudenflur | 2 | C |
| **LM** | **Staudenfluren und Säume frischer Standorte** | 2 | C |
| LMA | Staudenflur nährstoffarmer frischer Standorte | 1 | B |
| LRR | Dörfliche Ruderalflur | 1 | B |
| LRT | Ruderalflur trockenwarmer Standorte | 2 | C |
| **LT** | **Staudenfluren und Säume trockenwarmer Standorte** | 1 | A |
| **MB** | **Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf** | 2 | C |
| **MG** | **Großseggenried (außerhalb stehender Gewasser)** | 1 | B |
| MGA | Großseggenried nährstoffarmer Standorte | 1 | B |
| MGR | Großseggenried nährstoffreicher Standorte | 2 | C |
| **MH** | **Hoch- und Zwischenmoor** | 1 | B |
| MHB | Zwischenmoor des Berglandes | 1 | B |
| MHH | Hochmoor | 1 | A |
| MHN | Zwischenmoor des Tieflandes | 1 | B |
| MHZ | Zwischenmoor | 1 | B |
| **MK** | **Kleinseggenried** | 1 | B |
| MKA | Kleinseggenried basenarmer Standorte | 1 | B |
| MKR | Kleinseggenried basenreicher Standorte | 1 | A |
| **MN** | **Niedermoor/Sumpf** | 2 | C |
| MNB | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf | 2 | C |
| MNG | Großseggenried (außerhalb Verland.) | 1 | B |
| MNK | Kleinseggenried | 1 | B |
| MNR | Röhricht (außerhalb Verland.) | 2 | C |
| **MR** | **Röhricht (außerhalb stehender Gewässer)** | 2 | C |
| MRC | Schneiden-Röhricht | 1 | A |
| MRP | Rohrglanzgras-Röhricht | 2 | C |
| MRR | Rohrkolben-Röhricht | 2 | C |
| MRS | Schilfröhricht | 2 | C |
| MRW | Wasserschwaden-Röhricht | 2 | C |
| MRY | Sonstiges Landröhricht | 2 | C |

| Code | Bezeichnung | Wertstufe (Fördersatz) | Stufe A-D (VAK) |
|---|---|---|---|
| **MT** | **Moordegenerations- und -Regenerationsstadien** | 2 | C |
| MTP | Moorstadium mit Dominanz von Pfeifengras | 2 | C |
| MTW | Moorstadium mit Dominanz von Wollgräsern | 1 | B |
| MTZ | Moorstadium mit Dominanz von Zwergsträuchern | 2 | C |
| **RB** | **Borstgrasrasen** | 1 | A |
| RBF | Borstgrasrasen feuchter Standorte | 1 | A |
| RBM | Borstgrasrasen frischer bis trockener Standorte | 1 | A |
| **RH** | **Trocken- und Halbtrockenrasen** | 1 | A |
| RHC | Halbtrockenrasen bodensaurer Standorte | 1 | A |
| RHK | Kontinentaler Steppen-Trockenrasen | 1 | A |
| RHM | Submediterraner Halbtrockenrasen | 1 | A |
| RHS | Subkontinentaler Halbtrockenrasen | 1 | A |
| **RM** | **Schwermetallrasen** | 1 | B |
| **RS** | **Sand- und Silikatmagerrasen** | 1 | B |
| RSA | Anueller Sandmagerrasen | 1 | B |
| RSS | Silbergrasrasen | 2 | C |
| RSY | Sonstiger Sand- und Silikatmagerrasen | 1 | B |
| **RT** | **Trockenrasen** | 1 | B |
| RTH | Halbtrockenrasen | 1 | A |
| RTS | Sand- und Silikatmagerrasen | 1 | B |
| **SA** | **Altwasser** | 1 | B |
| **SK** | **naturnahes Kleingewässer** | 1 | B |
| SKA | Naturnahes ausdauerndes nährstoffarmes Kleingew. | 1 | A |
| SKR | Naturnahes ausdauerndes nährstoffreiches Kleingew. | 1 | B |
| SKT | Naturnahes temporäres Kleingewässer | 1 | B |
| **SM** | **Moorgewässer** | 1 | A |
| SMM | Naturnahes anthropogenes Moorgewässer | 1 | A |
| SMN | Moorgewässer natürlicher Entstehung | 1 | A |
| **SO** | **Verlandungsbereich mesotropher Stillgewässer** | 1 | B |
| SOG | Großseggen-, Wollgr.- u. Binsenbest. mesotr. Gew. | 1 | B |
| SOR | Röhricht mesotropher Gewässer | 2 | C |
| SOS | Strandlingsfluren und Zwergbinsengesellschaften | 1 | B |
| SOW | Tauch-u.Schwimmblattveg. mesotr.Stillg. | 1 | B |
| **SR** | **Naturnahes Rest- und Abbaugewässer** | 2 | C |
| SRA | Naturnahes nährstoffarmes Rest- und Abbaugewässer | 2 | C |
| SRR | Naturnahes nährstoffreiches Rest- und Abbaugew. | 2 | C |
| **SS** | **Naturnaher Teich/Weiher** | 2 | C |
| SSA | Naturnaher mesotropher Teich/Weiher | 1 | B |
| SSR | Naturnaher eutropher Teich/Weiher | 2 | C |
| **SV** | **Verlandungsbereich eutropher Stillgewässer** | 2 | C |
| SVG | Großseggenried eutropher Stillgewässer | 1 | B |
| SVR | Röhricht eutropher Stillgewässer | 2 | C |
| SVW | Tauch-u. Schwimmblattveg.eutr. Stillgew. | 2 | C |
| **SY** | **Sonstiges naturnahes Stillgewässer** | 2 | C |
| SYA | Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer | 2 | C |
| SYR | Sonst. naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer | 2 | C |
| **UA** | **Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker** | 1 | A |
| UAA | Basenarmer Löß- und Lehmacker | 1 | A |

| Code | Bezeichnung | Wertstufe (Fördersatz) | Stufe A-D (VAK) |
|---|---|---|---|
| UAB | Acker auf skelettreichem Silikatverwitterungsboden | 1 | B |
| UAR | Basenreicher Löß- und Lehmacker | 1 | A |
| UAS | Sandacker | 1 | A |
| **UR** | **Weinberg, extensiv** | 1 | B |
| **WA** | **Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche** | 1 | B |
| WAB | Erlen- und Eschen-Bachwald d. Berg- u. Hügellandes | 2 | C |
| WAN | Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald der Niederungen | 1 | A |
| WAQ | Erlen-Eschen-Quellwald | 1 | B |
| **WB** | **Bruchwald** | 1 | B |
| WBA | Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte | 1 | B |
| WBR | Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte | 1 | B |
| **WC** | **Bodensaurer Buchen(misch)wald** | 2 | C |
| WCB | Bodensaurer Tannen-Fichten-Buchenwald d. Bergl. | 2 | C |
| WCN | Bodensaurer  Buchenwald des Tief- und Hügellandes | 2 | C |
| **WE** | **Eichen-Hainbuchenwald** | 2 | C |
| WEF | Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte | 2 | C |
| WES | Lindenreicher Eichen-Hainbuchenw. subkont. Präg. | 1 | B |
| WET | Traubeneichen-Hainbuchenw. mäß. trock. Standorte | 2 | C |
| **WF** | **Fichtenwald** | 1 | B |
| WFB | Naturnaher Fichtenwald des Berglandes | 1 | B |
| WFN | Naturnaher Fichtenwald des Tieflandes | 1 | B |
| WFS | Naturnaher Fichten-Blockschuttwald | 1 | A |
| **WH** | **Hartholz-Auwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald)** | 1 | A |
| **WK** | **Kiefernwald** | 1 | B |
| WKF | Flechten - Kiefernwald | 1 | B |
| WKK | Kontinentaler Kiefernwald | 1 | B |
| WKS | Sonstiger naturnaher Kiefernwald | 2 | C |
| WKT | Kiefernwald trockenwarmer Fels- und Sandstandorte | 1 | B |
| **WL** | **Mesophiler Buchen(misch)wald** | 1 | B |
| WLB | Mesophiler Buchenwald des Berglandes | 1 | B |
| WLN | Mesophiler Buchenwald des Tief- und Hügellandes | 2 | C |
| **WM** | **Moorwald** | 1 | B |
| WMB | Moorbirken-Moorwald | 1 | B |
| WMF | Fichten-Moorwald | 1 | A |
| WMK | Waldkiefern-Moorwald | 1 | A |
| WML | Bergkiefern-Moorwald | 1 | A |
| WMS | Sonstiger Moorwald | 1 | B |
| **WO** | **Strukturreicher Waldrand** | 1 | B |
| **WP** | **Sumpfwald** | 2 | C |
| **WQ** | **Bodensaurer Eichen(misch)wald** | 2 | C |
| WQB | Bodensaurer Eichen-Mischwald d. Hügel- und Bergl. | 2 | C |
| WQN | Sonstiger bodensaurer Eichen-Mischwald d. Tiefl. | 2 | C |
| WQS | Bodensaurer Eichen-Mischwald armer Sandböden | 1 | B |
| **WS** | **Schlucht- und Blockschuttwald** | 2 | C |
| WSE | Ahorn-Eschenw. felsiger Schatthänge u. Schluchten | 2 | C |
| WSL | Ahorn-Linden-Schutthaldenwald | 1 | B |
| **WT** | **Laubwald trockenwarmer Standorte** | 1 | B |
| WTE | Eichenwald trockenwarmer Standorte | 1 | B |

| Code | Bezeichnung | Wertstufe (Fördersatz) | Stufe A-D (VAK) |
|---|---|---|---|
| WTH | Eichen-Hainbuchenwald trockenwarmer Standorte | 1 | B |
| **WV** | **Vorwald(stadien), Pionierwälder** | - | D |
| **WW** | **Weichholz-Auwald (Weiden-Auwald)** | 1 | A |
| **WZ** | **Höhlenreiche Altholzinsel** | 1 | A |
| **YB** | **Offene Binnendüne** | 1 | B |
| YBG | Offene Binnendüne mit lückigen Grasfluren | 1 | B |
| YBH | Offene Binnendüne mit trockenen Sandheiden | 1 | B |
| **YF** | **Offene natürliche und naturnahe Felsbildung** | 2 | C |
| YFA | Natürlicher basenarmer Silikatfels | 2 | C |
| YFK | Natürlicher Kalkfels | 1 | A |
| YFR | Natürlicher basenreicher Silikatfels | 2 | C |
| YFS | Natürlicher Serpentinitfels | 1 | A |
| **YG** | **Offene natürliche Block- und Geröllhalde** | 2 | C |
| YGA | Nat. Block-u.Geröllhal. aus bas.arm.Silikatgest. | 2 | C |
| YGR | Nat. Block-u.Geröllhal. aus bas.reich.Silikatgest. | 2 | C |
| YGS | Naturn.Block- u.Geröllhalde aus Serpentinitgest. | 1 | B |
| **YH** | **Unbefestigte Wege** | 2 | C |
| YHF | Unbefestigter Feldweg | 1 | B |
| YHH | Hohlweg | 2 | C |
| YHY | Sonstiger unbefestigter Weg | 2 | C |
| **YM** | **Natursteinmauer** | - | D |
| YMT | Trockenmauer | 1 | B |
| YMY | Sonstige Natursteinmauer | - | D |
| **YS** | **Steinrücken** | 1 | B |
| **YT** | **Höhlen und Stollen** | 2 | C |
| YTH | Höhle | 2 | C |
| YTS | Stollen früherer Bergwerke | 2 | C |
| **YW** | **Steilwände aus Lockergestein** | 1 | B |
| YWL | Lehm- und Lößwand | 1 | B |
| YWS | Sand- und Kieswand | 1 | B |